

CONCENTRATES 2.5 % FOR BREEDERS -NEW-
REARING + PULLET + LAYING (hatching eggs)
COMPOSITION COMPLETE ANIMAL FEED



BROILER BREEDERS & LAYER BREEDERS		REARING (ca. 0-6/8 weeks)				PULLET (ca. 6/8 - 20 weeks)				LAYING (HATCHING EGGS) (20 weeks - end)			
COMPOSITION PER TON OF COMPOUND FEED		SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards	SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards	SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards
		MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4
Intraco Rearing of Lay 2.5-20-1	kg	25	25	25	25	25	25	25	25	/	/	/	/
Intraco Breeder Adult 2.5-5-1	kg	/	/	/	/	/	/	/	/	25	25	25	25
Maize	kg	632,5	607,5	642,5	597,5	710	660	722,5	680	675	635	690	645
Soyabean meal 44% CP	kg	330	325	0	0	252,5	242,5	0	0	230	210	0	0
Soyabean meal 46% CP	kg	0	0	320	305	0	0	240	222,5	0	0	215	200
Limestone	kg	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	70	70	70	70
Wheat pollards/bran	kg	0	30	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60
Total feed	kg	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
ANALYSIS													
Crude protein	%	20,01	20,03	20,24	20,11	17,15	17,20	17,18	16,95	15,52	15,25	15,40	15,30
Crude fat	%	3,24	3,25	3,26	3,28	3,40	3,40	3,42	3,44	3,21	3,25	3,24	3,26
Crude fiber	%	3,61	3,78	3,41	3,75	3,30	3,65	3,13	3,46	3,01	3,32	2,84	3,18
Crude ash	%	5,40	5,47	5,22	5,34	4,97	5,11	4,80	4,91	11,10	11,18	10,92	11,05
Calcium	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,84	0,84	3,31	3,31	3,30	3,30
Total phosphorus	%	0,54	0,56	0,52	0,56	0,51	0,54	0,50	0,53	0,49	0,52	0,47	0,50
Phosphorus available Poultry	%	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,37	0,38	0,39	0,38	0,38
Phosphorus digestible Poultry	%	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36
Sodium	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Chlorine	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,23	0,23
Total Lysine	%	1,10	1,09	1,10	1,08	0,90	0,90	0,89	0,87	0,80	0,77	0,78	0,76
Lysine digestible Poultry	%	0,91	0,91	0,92	0,91	0,74	0,74	0,74	0,72	0,66	0,63	0,65	0,64
Total Methionine	%	0,51	0,51	0,51	0,51	0,48	0,48	0,48	0,47	0,37	0,37	0,37	0,37
Methionine digestible Poultry	%	0,48	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36	0,35	0,35	0,35
Total Methionine + Cystine	%	0,83	0,84	0,84	0,84	0,76	0,77	0,76	0,76	0,64	0,63	0,63	0,63
Meth. + Cyst. digestible Poultry	%	0,73	0,74	0,74	0,74	0,68	0,68	0,68	0,68	0,56	0,55	0,56	0,56
Total Tryptophane	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Total Threonine	%	0,77	0,77	0,79	0,78	0,66	0,66	0,66	0,65	0,60	0,58	0,59	0,58
Linoleic Acid (C18:2)	%	1,50	1,49	1,51	1,50	1,60	1,58	1,61	1,61	1,52	1,52	1,54	1,53
Available Xanthophylls	ppm	11,4	10,94	11,57	10,76	12,79	11,89	13,01	12,25	12,16	11,45	12,43	11,62
Metabolisable Energy Poultry	Kcal/kg	2925	2900	2925	2900	2900	2850	2925	2875	/	/	/	/
Metabolisable Energy Laying hens	Kcal/kg	/	/	/	/	/	/	/	/	2875	2825	2900	2850