

**BROILER CONCENTRATES 2.5% -NEW-
STARTER + GROWER/FINISHER
COMPOSITION COMPLETE ANIMAL FEED**



FOR BROILER		STARTER (ca. 0-12 days)				GROWER (12 days - 35 days)				FINISHER (35 days - slaughter market weight)			
COMPOSITION PER TON OF FEED		soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards	soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards	soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards
		MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4
INTRACO Broiler 2.5 -20-1 Starter	kg	25	25	25	25	/	/	/	/	/	/	/	/
Broiler 2.5-20-1 Grower/Finisher	kg	/	/	/	/	25	25	25	25	25	25	25	25
Maize	kg	605	600	625	615	630	620	645	635	645	635	660	650
Soybean meal 44% CP	kg	360	350	0	0	335	330	0	0	320	315	0	0
Soybean meal 46% CP	kg	0	0	340	335	0	0	320	315	0	0	305	300
Limestone granular	kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wheat pollards/bran	kg	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15
Total feed	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ANALYSIS													
Crude protein	%	21,10	20,95	21,05	21,02	20,15	20,10	20,25	20,20	19,62	19,55	19,68	19,60
Crude fat	%	3,19	3,21	3,25	3,25	3,24	3,25	3,27	3,28	3,27	3,28	3,3	3,31
Crude fiber	%	3,67	3,72	3,40	3,50	3,63	3,71	3,41	3,49	3,57	3,65	3,36	3,44
Crude ash	%	5,47	5,48	5,23	5,26	5,18	5,21	4,97	5,00	5,10	5,12	4,89	4,92
Calcium	%	0,84	0,84	0,84	0,84	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Total phosphorus	%	0,59	0,59	0,56	0,57	0,55	0,55	0,53	0,53	0,54	0,55	0,52	0,53
Phosphorus available Poultry	%	0,42	0,42	0,41	0,42	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Phosphorus digestible Poultry	%	0,40	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Sodium	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Chlorine	%	0,22	0,22	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2
Total Lysine	%	1,20	1,18	1,19	1,18	1,10	1,10	1,10	1,10	1,07	1,06	1,06	1,06
Lysine digestible Poultry	%	1,02	1,00	1,01	1,00	0,93	0,92	0,93	0,92	0,89	0,89	0,89	0,89
Total Methionine	%	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,52	0,51	0,51	0,51
Methionine digestible Poultry	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
Total Methionine + Cystine	%	0,86	0,86	0,86	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83
Meth. + Cyst. digestible Poultry	%	0,76	0,76	0,77	0,77	0,74	0,74	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
Total Tryptophane	%	0,24	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Total Threonine	%	0,82	0,81	0,82	0,81	0,78	0,78	0,79	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76
Linoleic Acid (C18:2)	%	1,46	1,47	1,49	1,49	1,50	1,50	1,52	1,52	1,52	1,52	1,54	1,53
Available Xantophylls	ppm	10,90	10,85	11,26	11,08	11,35	11,17	11,62	11,44	11,62	11,44	11,89	11,71
Metabolisable Energy	kcal/kg	2800	2800	2850	2825	2850	2850	2875	2875	2875	2875	2900	2900