

CONCENTRATES 5 % FOR BREEDERS -NEW-
REARING + PULLET + LAYING (hatching eggs)
COMPOSITION COMPLETE ANIMAL FEED



BROILER BREEDERS & LAYER BREEDERS		REARING (ca. 0-6/8 weeks)				PULLET (ca. 6/8 - 20 weeks)				LAYING (HATCHING EGGS) (20 weeks - end)			
COMPOSITION PER TON OF COMPOUND FEED		SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards	SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards	SOYA 44% CP	SOYA 44% CP + wheat pollards	SOYA 46% CP	SOYA 46% CP + wheat pollards
		MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4
Intraco Rearing of Lay 5-30-1	kg	50	50	50	50	50	50	50	50	/	/	/	/
Intraco Breeder Adult 5-30-1	kg	/	/	/	/	/	/	/	/	50	50	50	50
Maize	kg	627,5	592,5	647,5	597,5	710	655	720	660	675	630	685	635
Soyabean meal 44% CP	kg	315	300	0	0	230	195	0	0	200	185	0	0
Soyabean meal 46% CP	kg	0	0	295	285	0	0	220	200	0	0	190	170
Limestone	kg	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10	75	75	75	75
Wheat pollards/bran	kg	0	50	0	60	0	90	0	80	0	60	0	70
Total feed	kg	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
ANALYSIS													
Crude protein	%	20,26	20,10	20,12	20,18	17,16	16,56	17,24	17,06	15,60	15,47	15,58	15,35
Crude fat	%	3,26	3,28	3,30	3,31	3,42	3,47	3,44	3,47	3,25	3,27	3,27	3,30
Crude fiber	%	3,69	3,95	3,46	3,81	3,34	3,79	3,19	3,64	3,18	3,51	3,05	3,43
Crude ash	%	5,34	5,42	5,11	5,26	5,11	5,22	4,97	5,13	11,13	11,25	11,00	11,13
Calcium	%	0,86	0,86	0,85	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93	3,35	3,35	3,34	3,35
Total phosphorus	%	0,53	0,55	0,50	0,54	0,49	0,54	0,48	0,52	0,47	0,50	0,46	0,49
Phosphorus available Poultry	%	0,36	0,37	0,35	0,37	0,35	0,36	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35
Phosphorus digestible Poultry	%	0,35	0,36	0,34	0,36	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34
Sodium	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Chlorine	%	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24
Total Lysine	%	1,14	1,12	1,12	1,11	0,92	0,87	0,92	0,90	0,83	0,81	0,82	0,80
Lysine digestible Poultry	%	0,94	0,92	0,93	0,92	0,75	0,71	0,75	0,73	0,67	0,66	0,67	0,65
Total Methionine	%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,48	0,47	0,48	0,48	0,33	0,33	0,33	0,33
Methionine digestible Poultry	%	0,49	0,49	0,48	0,48	0,46	0,45	0,46	0,46	0,31	0,31	0,31	0,31
Total Methionine + Cystine	%	0,84	0,84	0,84	0,84	0,77	0,76	0,77	0,77	0,59	0,59	0,59	0,59
Meth. + Cyst. digestible Poultry	%	0,74	0,74	0,74	0,74	0,68	0,67	0,68	0,68	0,51	0,51	0,51	0,51
Total Tryptophane	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,19	0,18	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Total Threonine	%	0,79	0,78	0,79	0,78	0,67	0,64	0,67	0,66	0,61	0,60	0,61	0,59
Linoleic Acid (C18:2)	%	1,47	1,47	1,50	1,49	1,58	1,58	1,60	1,58	1,51	1,50	1,52	1,52
Available Xantophylls	ppm	11,30	10,67	11,66	10,76	12,78	11,79	12,96	11,88	12,16	11,35	12,35	11,44
Metabolisable Energy Poultry	Kcal/kg	2850	2800	2900	2800	2950	2925	2975	2925	/	/	/	/
Metabolisable Energy Laying hens	Kcal/kg	/	/	/	/	/	/	/	/	2900	2800	2925	2850