

**BROILER CONCENTRATES 5% -NEW-
STARTER + GROWER/FINISHER
COMPOSITION COMPLETE ANIMAL FEED**



FOR BROILER		STARTER (ca. 0-12 days)				GROWER (12 days - 35 days)				FINISHER (35 days - slaughter market weight)			
COMPOSITION PER TON OF FEED		soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards	soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards	soya 44% CP	soya 44% CP + wheat pollards	soya 46% CP	soya 46% CP + wheat pollards
		MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4
INTRACO Broiler 5-32-1 Starter	kg	50	50	50	50	/	/	/	/	/	/	/	/
INTRACO Broiler 5-30-1 Grow/Finish	kg	/	/	/	/	50	50	50	50	50	50	50	50
Maize	kg	600	585	620	600	625	610	640	615	640	620	655	630
Soybean meal 44% CP	kg	340	335	0	0	320	315	0	0	305	300	0	0
Soybean meal 46% CP	kg	0	0	320	320	0	0	305	300	0	0	290	285
Limestone granular	kg	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Wheat Pollards/bran	kg	0	20	0	20	0	20	0	30	0	25	0	30
Total feed	kg	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
ANALYSIS													
Crude protein	%	21,24	21,21	21,16	21,30	20,46	20,42	20,52	20,55	19,91	19,92	19,95	19,98
Crude fat	%	3,19	3,20	3,23	3,23	3,26	3,27	3,29	3,30	3,29	3,30	3,32	3,33
Crude fiber	%	3,90	4,02	3,66	3,80	3,71	3,82	3,50	3,68	3,65	3,80	3,45	3,63
Crude ash	%	5,41	5,43	5,17	5,23	5,13	5,17	4,92	5,00	5,04	5,10	4,84	4,92
Calcium	%	0,81	0,81	0,81	0,81	0,76	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Total phosphorus	%	0,59	0,60	0,57	0,58	0,53	0,54	0,51	0,53	0,52	0,54	0,50	0,52
Phosphorus available Poultry	%	0,41	0,41	0,41	0,41	0,36	0,37	0,35	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36
Phosphorus digestible Poultry	%	0,40	0,40	0,39	0,39	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,36	0,34	0,35
Sodium	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Chlorine	%	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22
Total Lysine	%	1,19	1,19	1,17	1,18	1,15	1,14	1,14	1,14	1,11	1,11	1,10	1,10
Lysine digestible Poultry	%	0,99	0,98	0,98	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,92	0,92	0,92
Total Methionine	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51
Methionine digestible Poultry	%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Total Methionine + Cystine	%	0,89	0,89	0,88	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84
Meth. + Cyst. digestible Poultry	%	0,78	0,78	0,78	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
Total Tryptophane	%	0,25	0,25	0,24	0,25	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Total Threonine	%	0,83	0,83	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78
Linoleic Acid (C18:2)	%	1,44	1,44	1,47	1,46	1,47	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49	1,51	1,50
Available Xantophylls	ppm	10,80	10,53	11,16	10,80	11,25	10,98	11,52	11,10	11,52	11,16	11,79	11,34
Metabolisable Energy	kcal/kg	2750	2700	2850	2800	2825	2775	2850	2800	2875	2825	2900	2850